



狗狗每日搔癢紀錄表

每日紀錄狗狗的搔癢程度，
幫助您衡量狗狗的搔癢嚴重性

搔癢程度	搔癢指數	天數																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
極度嚴重搔癢 - 狗狗幾乎一直持續地搔抓、啃咬、舔拭，搔癢幾乎沒有停過	9-10																												
嚴重搔癢 - 狗狗清醒時、以及在吃飯、玩樂、運動或分心時，搔癢持續的發作	7-8																												
中度搔癢 - 狗狗清醒時，搔癢持續的發作，但在吃飯、玩樂、運動或分心時不會搔癢	5-6																												
輕微搔癢 - 搔癢稍微發作，夜間可能偶爾會注意到搔癢的發作	3-4																												
非常輕微搔癢 - 搔癢偶爾發作，狗狗比皮膚問題開始之前稍微更癢	1-2																												
正常 - 沒有搔癢問題	0																												

apoquel 安癢快®
(oclacitinib tablet)

毛孩健康不能等

安癢快® (安全) (止癢) (快速)

恢復毛孩健康快樂光采



apoquel 安癢快 打破惱人的搔癢循環

注意事項

- 安癢快® 錠劑須依獸醫師 (佐) 處方使用。
- 請依醫師指示回診檢查並確認治療效果。
- 未滿 12 月齡狗狗請勿服用。
- 某些狗狗使用後可能會有輕微嘔吐與腹瀉現象。

zoetis 寵物健康網 www.pet-care.com.tw

追蹤社群 @zoetispetcare Zoetis 臺灣碩騰

您的狗狗曾經沒來由抓癢，或是抓癢過度到流血的情況嗎？有些狗狗因為發癢，晚上常常睡不安穩、焦躁不安。白天常在地上摩擦舔腳，嚴重還有皮膚紅腫掉毛現象。這時候，需要您特別關心狗狗搔癢情形並記錄下來。

為什麼狗狗會搔癢？

“搔癢”是狗狗皮膚過敏的症狀之一，身體對特定物質產生過度反應而造成。正確認識狗狗搔癢因素，就能早日讓狗狗恢復正常生活。以下是常見引起狗狗搔癢的原因：



認識狗狗搔癢週期與症狀

狗狗過度抓癢，容易抓傷而使症狀惡化。讓狗狗在搔癢初期就能先阻止搔癢週期的循環，這種治療策略對狗狗止癢極為重要。



什麼是安癢快® APOQUEL®?

安癢快® (oclacitinib tablet) 是一種全新止癢治療藥品，專門針對狗狗皮膚過敏或是異位性皮膚炎，透過抑制搔癢與發炎訊號源頭的傳遞功能，而達到止癢與消炎效果。

- 快速性**
用藥 4 小時內開始緩解犬隻搔癢症狀。24 小時顯著改善搔癢。
- 獨特性**
是目前唯一直接針對犬隻搔癢源頭專門設計的治療藥物。有效止癢並且舒緩發炎現象。
- 安全性**
非類固醇、環孢素、抗組織胺類等藥物，相較之下有更高安全性、更低副作用。可以長期服用。

狗狗接受安癢快® 治療後…生活將會展開全新的一頁

- 狗狗身上皮膚紅腫與發炎搔癢現象會有顯著的減少¹。
- 狗狗使用安癢快® 後，仍然可以正常與其他常見治療方式一起搭配²。


使用安癢快® 時	可使用抗生素
	可施打疫苗
	可使用非類固醇類消炎止痛藥
	可使用除蟲藥
	可使用過敏相關的免疫治療

- 狗狗使用安癢快® 後，仍然可以進行過敏原檢測，不會影響檢測結果³。

1. Cosgrove SB et al. A blinded, randomized, placebo-controlled trial of the efficacy and safety of the Janus kinase inhibitor oclacitinib (Apoquel®) in client-owned dogs with atopic dermatitis. Vet Dermatol 2013; 24: 587-e142. 2. Apoquel® SPC.3. Aleo MM, Galvan EA, Fleck JT, et al. Effects of oclacitinib and prednisolone on skin test sensitivity [abstract]. Vet Dermatol. 2013; 24(3)

安癢快® 改善生活品質

一般狗狗平均壽命只有十幾年，您一定希望看見家中狗狗們維持健康與擁有良好生活品質。根據美國寵物主人調查的一份研究報告顯示，使用安癢快® 後，有將近 97% 的主人們認為安癢快® 改善他們狗狗的生活品質。並且有 95% 的主人們也認為，因著狗狗生活品質改善，也改善主人們的生活。



Data on file. Pet Owner Survey Aggregate Report 4-10-14.

安癢快® 給藥方式

- 依據狗狗體重公斤數計算，每公斤給予 0.4-0.6 毫克劑量。
- 用法及用量
開始使用時，每日口服用藥 2 次持續 14 天。
- 治療 14 天後，維持相同劑量，但每日僅口服投藥 1 次即可。

